



## Opatrunek kolisty



Obwój kolisty wykonuje się dookoła 1 osi, można wykonać kilka razy tak, aby każda następna opaska pokrywała w pełni poprzednią (1).


W tym przypadku jest on początkiem obwoju śrubowego. Obwój śrubowy - obwoje nakładamy od dołu do góry, każdy obwój następny pokrywa 2/3 poprzedniego (2).

## Opatrunek żółwiowy rozbieżny




Rozpoczynamy obwojem kolistym nieco skośnym na przedramieniu tuż poniżej czubka łokcia (1) przechodzimy na ramię, przeprowadzając obwój kolisty nieco skośny tuż powyżej czubka łokcia (2) wracamy znowu na przedramię, przeprowadzając obwój nieco bliżej czubka łokcia, pokrywając 1/3 poprzedniego (3) Przeprowadzamy jeszcze jeden obwój na ramieniu i przedramieniu, pokrywając 2/3 poprzedniego i kończymy na środku łokcia (4).

## Opatrunek żółwiowy zbieżny






Rozpoczynamy obwojem kolistym nieco skośnym na przedramieniu tuż poniżej czubka łokcia (1) przechodzimy na ramię, przeprowadzając obwój kolisty nieco skośny tuż powyżej czubka łokcia (2) wracamy znowu na przedramię, przeprowadzając obwój nieco bliżej czubka łokcia, pokrywając 1/3 poprzedniego (3).

Przeprowadzamy jeszcze jeden obwój na ramieniu i przedramieniu, pokrywając 2/3 poprzedniego i kończymy na środku łokcia (4).



## Opatrunek kłosowy ramienia i barku pojedynczy zstępujący





Rozpoczynamy obwojem kolistym dookoła klatki piersiowej tuż pod pachami, pierwszy obwój kłosujący przeprowadzamy ukośnie przez plecy (1). Dookoła barku chorego przeprowadzamy pierwszą pętlę kłosową jak najbliżej szyi i dalej opaskę skośnie przez klatkę piersiową, pod zdrową pachę (2).

Na rycinie widać wyżej wymienione obwoje powtórzone trzy razy; obwój zakończono na ramieniu, poniżej barku (3).

Przy bandażowaniu ramienia lewego obwojem zstępującym pierwsza opaska skośna (kłosująca) przeprowadzona jest przez klatkę piersiową.


## Opatrunek kłosowy wstępujący (ósemkowy)



Rozpoczynamy obwojem kłosowym na nadgarstku, przeprowadzamy obwój skośny aż do łokcia i tuż pod łokciem wzmacniamy obwojem kolistym (1), następnie przeprowadzamy obwój skośny od łokcia do nadgarstka - powstaje pierwsze kłosowanie (2).

Obwoje kłosujące powtórzono 4 razy, zakończono obwojem kolistym tuż pod łokciem (3).


## Opatrunek kłosowy dłoni pełny




Rozpoczynamy obwojem kolistym na nadgarstku i następnie od wnętrza dłoni przeprowadzamy opaskę powrotną (tam i z powrotem) przez środek złączonych palców (1), następnie skośnie z prawej strony (2), potem skośnie z lewej strony, po czym wszystkie opaski powrotne przymocowujemy obwojem kolistym przez środek złączonych palców (3). Zaczynamy kłosowanie począwszy od czubków palców tak aby przykryć 2/3 ostatniej opaski powrotnej (4,5). W podobny sposób wykonujemy drugi obwój kłosowy, i następane aż do całkowitego zakrycia dłoni (6,7,8,). Kończymy obwojem kolistym na nadgarstku, koniec banda umocowujemy przylepcem (9).

## Opatrunek Dessaulta

Pod umytą i osuszoną pachę (strony chorej) wkładamy walek, wykonany ze ściśle zwiniętej ligniny lub waty owiniętej gazą (1), chore ramię przybandażujemy obwojami śrubowymi do klatki piersiowej (2) i rozpoczynamy obwoje trójosiowe Dessaulta – pacha, ramię, łokieć – zaczynamy od zdrowej pachy na chore ramię (3).




Prowadzimy od tyłu pod chore łokieć (4) i od przodu pod zdrową pachę (5), i znowu od tyłu na chore ramię (6), od przodu wzdłuż ramienia pod chorego łokieć (7) i od tyłu pod zdrową pachę (8).



Na rycinie (9) widać obwoje trójosiowe (jak na ryc. 3, 4, 5, 6, 7, 8), powtórzone 3 razy, tylko nieco niżej i dalej, dzięki czemu powstał opatrunek kłosowy, zakończony agrafką nad łokciem (można gdzie indziej).


Opatrunek zakończony, dodajemy mały temblak w postaci pętli bandaży na zwisającą dłoń (10).



### Uwaga:

Opatrunek Dessaulta po stronie prawej wykonujemy tak samo, z tym że pierwszy obwój trójosiowy prowadzimy z tyłu od zdrowej pachy przez plecy na chore ramię.

## Opatrunek „czapka Hipokratesa”



Do wykonania obwoju potrzebna jest opaska dwugłowa, powstała albo ze zwinięcia jednej długiej opaski z dwóch stron, albo wskutek zeszywania ze sobą dwóch opasek. W prawej ręce trzymamy opaskę, którą bandażujemy wokół czoła. W lewej ręce trzymamy opaskę, którą bandażujemy opaski powrotnie przez ciemię. Rozpoczynamy obwojem kolistym wokół czoła (1) na potylicy zakładamy opaskę, trzymaną w lewej ręce pod tę, którą trzymamy w prawej (2) opaskę podłożoną zginamy równo z obwojem kolistym i przeprowadzamy aż do czoła poprzez ciemię (3) i dalej na czoło, po czym przybandażowujemy ją połową obwoju kolistego (4) następnie opaskę pionową zginamy równo z obwojem kolistym i przeprowadzamy skośnie półkuliście do tyłu (5) gdzie również ją przybandażowujemy obwojem kolistym, następnie znowu zginając, przeprowadzamy z drugiej strony opaski środkowej w stronę czoła (6). Opaski powrotne zginane raz z lewej, raz z prawej strony ciemienia, przytrzymywane obwojami okrężnymi wokół czoła przeprowadzamy tyle razy, ile potrzeba, aby pokryć całe ciemię. Na rycinie (7,8) widać obwoje zginane przeprowadzane po trzy razy z każdej strony opaski środkowej, za każdym razem przytrzymywane obwojem kolistym. Opatrunek zakończono na czole.